

# 1 Welke mensen gebruiken alleen een SABA bij Astma

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Inzicht
- Ga naar Patiënten selecteren



→ Voeg onderstaande criteria toe

Toon patiënten waar: Reset

1 2 3

Ingeschreven

EN Episodes, alleen actief bevat waarde beginnend met

EN Medicatie in de afgelopen 12 m... bevat waarde beginnend met

EN Medicatie in de afgelopen 12 bevat **geen** waarde beginnend met

EN Medicatie in de afgelopen 12 bevat **geen** waarde beginnend met

EN Medicatie in de afgelopen 12 bevat **geen** waarde beginnend met

EN Medicatie in de afgelopen 12 bevat **geen** waarde beginnend met

of   
 en

Stofnaam	Merksnaam	ATC-code
<b>kortwerkende B-agonisten</b>		
Salbutamol	Airomir, Salbutamol, Ventolin	R03AC02
Terbutaline	Bricanyl	R03AC03
<b>langwerkende B-agonisten</b>		
Formotorol	Atimos, Formotorol, Oxis, Foradil	R03AC13
Indacaterol	Onbrez	R03AC18
Salmeterol	Serevent	R03AC12
Olodaterol	Striverdi	R03AC19
<b>Anticholinergica</b>		
Ipratropium	Atrovent, Ipratropium	R03BB01
Aclidinium	Eklira	R03BB05
Umeclidinium	Incruse	R03BB07
Glycopyrronium	Seebri	R03BB06
Tiotropium	Spiriva, Tiotropium	R03BB04
<b>Inhalatiecorticosteroiden</b>		
Ciclesonide	Alvesco	R03BA08
Beclometason	Qvar, Beclometason	R03BA01
Budesonide	Pulmicort, Budesonide	R03BA02
fluticasonpropionaat	Flixotide	R03BA05
<b>Combinaties</b>		
budesonide/salmeterol	Busalair	R03AK12
salmeterol/fluticason	Aerivio, Airflusal, Seretide, Vincion	R03AK06
formoterol/budesonide	Bufoleer, Duoresp, Symbicort	R03AK07
umeclidinium/vilanterol	Anoro	R03AL03
fluticason/umeclidinium/vilanterol	Trelegy	R03AL08
formoterol/fluticason	Flutiform	R03Ak11
formoterol/beclometason	Foster	R03AK08
vilanterol/fluticasonfuroaat	Relvar	R03AK10
aclidinium/formoterol	Duaklir	R03AL05
tiotropium/olodaterol	Spiolto	R03AL06
fenoterol/ipratropium	Berodual	R03AL01
beclometason/formoterol/glycopyrronium	Trimbow	R03AL09
indacaterol/glycopyrronium	Ultibro	R03AL04
<b>Corticosteroiden systemisch</b>		
Prednison		H02AB07
Prednisolon		H02AB06

## 2 Hoeveel kinderen hebben de episode astma

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Rapporten
- Kies onder Zorgstraat voor ASTMA
- Klik op het blokje links voor de titel NHG Astma bij kinderen v1.2 patiëntenlijst
- Klik op Rapport genereren
- Klik op Download rapport
- Het rapport opent zich nu in Excel (het bevat 4 tabbladen)

### Vraag: Hoeveel kinderen gebruiken inhalatiemedicatie

- Kies het laatste tabblad (Patiëntenlijst NHG Astma) en hierop staan alle kinderen met astma
- Ga naar kolom AR ( $\geq 1$  voorschriften inhalatiemedicatie)
- Selecteer bij het filter (driehoekje) alleen op "ja"
- Nu heb je de selectie kinderen  $< 16$  jaar met de episode astma en medicatie

Indien je zorggroep geen Astma ketenzorg aanbiedt heb je vaak niet de beschikking over het NHG Astma bij kinderen v1.2 patiëntenlijst

In dat geval maak je je eigen zoekopdracht.

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Inzicht
- Ga naar Patiënten selecteren
- Voeg onderstaande criteria toe

Toon patiënten waar: Reset

	1	2	3
	Ingeschreven	gelijk aan	Ja
EN	Leeftijd	kleiner of gelijk aan	16
EN	Episodes, alleen actief	bevat waarde beginnend met	R96
EN	Medicatie in de afgelopen 12	bevat waarde beginnend met	r03

of  
en



### 3 Hoeveel kinderen jonger dan 16 jaar gebruiken longmedicatie zonder episode astma

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Inzicht
- Ga naar Patiënten selecteren
- Voeg onderstaande criteria toe

Toon patiënten waar: Reset

	1	2	3	
	Ingeschreven	gelijk aan	Ja	
EN	Medicatie in de afgelopen 12 m...	bevat waarde beginnend met	r03	
EN	Episodes, alleen actief	bevat geen waarde beginnend met	r95	
EN	Episodes, alleen actief	bevat geen waarde beginnend met	r96	
EN	Leeftijd	kleiner of gelijk	16	

of of  
en

- Klik op Filter uitvoeren
- Klik op Resultaat exporteren
- Je hebt nu je selectie in Excel

## 4 Hoeveel mensen met COPD gebruikt een ICS

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Ketenzorgdashboard
- Ga naar Zorgstraat COPD
- Ga naar tabblad Zorg
- Ga naar Behandeling

3.049

Zorgstraat: COPD

Kwartaal: 17-02-2023 (Laatste extractie)

Populatie

Zorg

De meetperiode is 12 maanden, tenzij anders vermeld.

Zoek indicator

Praktijk Norm

Behandeling

Download patiëntenlijst

- Zoek de cirkeldiagram ICS
- Klik op “Wel ICS”
- Je ziet nu de mensen die én COPD hebben én een ICS gebruiken

### Vraag: Hoeveel van deze mensen met COPD gebruikt mogelijk ongepast een ICS

- Scroll helemaal naar beneden en je ziet onderstaand overzicht
- De mensen op de 2 onderste regels gebruiken mogelijk ongepast ICS

COPD patiënten zonder Astma Bekijk trendlijn

	Aantal praktijk	Percentage praktijk
COPD patiënten zonder Astma	28	90,3%
COPD patienten zonder Astma met ICS	7	25,0%
COPD patienten zonder Astma met ICS en <2 longaanvallen <12 mnd	2	28,6%

## 5 Hoeveel mensen met COPD hebben ook hartfalen

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Inzicht
- Ga naar Patiënten selecteren
- Voeg onderstaande criteria toe

Toon patiënten waar:

Reset

1 2 3

	Ingeschreven	gelijk aan	Ja	
EN	Episodes, alleen actief	bevat waarde beginnend met	r95	
EN	Episodes, alleen actief	bevat waarde beginnend met	k77	

of of  
en 

- Klik op Filter uitvoeren
- Klik op Resultaat exporteren
- Je hebt nu je selectie in Excel

## 6 Hoeveel mensen met astma hebben twee of meer longaanvallen gehad waarvoor corticosteroid stootkuren zijn voorgeschreven

- Ga naar VIPLive
  - Ga naar Rapporten
  - Kies onder Zorgstraat voor ASTMA
  - Klik op het blokje links voor de titel Kwartaalrapport Astma patiëntenlijst v3.0
  - Klik op Rapport genereren (dit kan een paar minuten duren)
  - Klik op Download rapport
  - Het rapport opent zich nu in Excel (het bevat tabbladen)
- 
- Kies het laatste tabblad (Patiëntenlijst Astma) en hierop staan alle mensen met astma
  - Ga naar kolom CX (2 of meer corticosteroid stootkuren Prednisolon)
  - Selecteer bij het filter (driehoekje) alleen op "ja"
  - Nu heb je de selectie mensen met Astma die twee of meer systemische corticoïdstootkuren Prednisolon hebben gekregen
  - In Kolom CY zie je het aantal stootkuren dat is voorgeschreven

Indien je zorggroep geen Astma ketenzorg aanbiedt heb je vaak niet de beschikking over het Kwartaalrapport Astma patiëntenlijst v3.0.

In dat geval maak je je eigen zoekopdracht. *(Je krijgt nu een lijst met alle mensen met een episode astma en 1 of meer corticosteroidstootkuren. Je moet dan zelf nog kijken welke mensen 2 of meer kuren hebben gehad).*

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Inzicht
- Ga naar Patiënten selecteren
- Voeg onderstaande criteria toe

Toon patiënten waar:

[Reset](#)

	1	2	3
	Ingeschreven	gelijk aan	Ja
EN	Episodes, alleen actief	bevat waarde beginnend met	r96
EN	Medicatie in de afgelopen 12 m...	bevat waarde beginnend met	h02ab06
OF	Medicatie in de afgelopen 12 m...	bevat waarde beginnend met	h02ab07

of of  
en en

## **7 Hoeveel mensen met COPD hebben twee of meer longaanvallen gehad waarvoor corticosteroïd stootkuren zijn voorgeschreven**

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Rapporten
- Kies onder Zorgstraat voor COPD
- Klik op het blokje links voor de titel Kwartaalrapport COPD patiëntenlijst v3.0
- Klik op Rapport genereren
- Klik op Download rapport
- Het rapport opent zich nu in excel (het bevat tabbladen)
- Kies het laatste tabblad (Patiëntenlijst COPD) en hierop staan alle mensen met COPD
- Ga naar kolom EO (2 of meer voorschriften corticosteroid stootkuren <12mnd bekend)
- Selecteer bij het filter (driehoekje) alleen op "ja"
- Nu heb je de selectie mensen met COPD die twee of meer corticoïdstootkuren hebben gekregen
- In Kolom EP (Prednison) en ER (Prednisolon) zie je het aantal stootkuren dat is voorgeschreven

## **8 Hoeveel mensen met COPD hebben een matig of verhoogde ziektelast**

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Rapporten
- Kies onder Zorgstraat voor COPD
- Klik op het blokje links voor de titel Aandachtspunten COPD
- Klik op Rapport genereren
- Klik op Download rapport
- Het rapport opent zich nu in excel (het bevat tabbladen)
- Kies op de startpagina voor het getal in regel 8 "COPD patiënten en geen ziektelast geregistreerd <12mnd"
- Ga naar kolom M (ziektelast)
- Selecteer bij het filter (driehoekje) alleen "matig en verhoogd". Je ziet nu ook gelijk de mensen waarbij de ziektelast in het HIS niet is ingevuld.



## 9 Hoeveel mensen met Astma hebben onvoldoende controle (ACQ > 0.75)

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Inzicht
- Ga naar Patiënten selecteren
- Voeg onderstaande criteria toe

Toon patiënten waar:

Reset

1	2	3			
Ingeschreven	gelijk aan	Ja			
EN	Episodes, alleen actief	bevat waarde beginnend met	R96		
EN	Medicatie in de afgelopen 12 m.	bevat waarde beginnend met	R03		
EN	Hoofdbehandelaar astma (2406)	gelijk aan	huisarts		
EN	Score astma control questionn...	groter dan	0.75	0 punt 75 (geen komma)	

of of  
en

Kolommen

Score ACQ6 astma control quest 6 vragen (3602) ✕ Hoofdbehandelaar astma (2406) ✕ BSN ✕

Episodes, alleen actief ✕ Geboortedatum ✕ Medicatie in de afgelopen 12 maanden ✕ Patiëntnummer ✕

Samengestelde naam ✕ Kolom toevoeg

- Klik op Filter uitvoeren
- Klik op Resultaat exporteren
- Je hebt nu je selectie in Excel

## 10 Hoeveel mensen hebben Allergische Rhinitis en gebruiken hiervoor medicatie

- Ga naar VIPLive
- Ga naar Inzicht
- Ga naar Patiënten selecteren
- Voeg onderstaande criteria toe

Toon patiënten waar:

Reset

1 2 3

Ingeschreven  gelijk aan  Ja

EN Episodes, alleen actief bevat waarde beginnend met R97

EN Medicatie in de afgelopen 12 r bevat waarde beginnend met R01A

OR Medicatie in de afgelopen 1 bevat waarde beginnend met R06A

of of of  
en en en

- Klik op Filter uitvoeren
- Klik op Resultaat exporteren
- Je hebt nu je selectie in Excel